

TESTELE ROMÂNĂ, LA NEONATOLOGIE.***Complementul simplu***

1. Marcați cauzele ce nu determină respirația puerilă la nou-născuți :

- a) Elasticitatea înaltă și peretele toracic subțire
- b) Asocierea respirației laringiale
- c) Distanța mică de la fisura vocală până la locul auscultației respirației
- d) Oxigenarea eficientă cu masca
- e) Persistența canalului arterial

2. Alegeți care nu se referă la mecanismele pierderilor de căldură la nou-născuți?

- a) Radiația
- b) Conducție
- c) Iradiere
- d) Evaporare
- e) Convecția

3. Afirmati care din următoarele situații pot fi legate cu mirosul de "șoarece" de la nou-născut :

- a) Boala Goșe
- b) Sindromul Patau
- c) Fenilcetonuria
- d) Leucinoza
- e) Administrarea vitaminelor

4. Selectați afirmația corectă despre milia la nou-născuți :

- a) Obturația canalelor sudoripare
- b) Obturația canalelor glandelor sebacee
- c) Afectarea bacteriană a foliculelor glandelor sebacee
- d) Obturația canalelor sudoripare și sebacee
- e) Afectarea bacteriană a canalelor sudoripare

5. Marcați care fontanelă poate fi deschisă la naștere la un nou-născut normoponderal :

- a) Laterale anterioare
- b) Laterale posterioare
- c) Posterioară
- d) Anterioară
- e) Anterioară și posterioară

6. Marcați cantitatea de urină eliminată de un nou-născut normoponderal în primele ore de viață?

- a) 50 ml/kcorp
- b) 25 ml/kcorp
- c) 6-8 ml/kcorp
- d) Anurie fiziologică sau oligurie
- e) 40 ml/kcorp

7. Alegeți nivelul de temperatură care se consideră normal la nou-născut:

- a) 35,0-35,1 °C
- b) 36,0-36,1 °C
- c) 36,1-36,5 °C
- d) 36,6-37,4 °C

e) 37,4-38,0°C

8. Selectați care lapte conține cea mai mică cantitate de grăsimi?

- a) Colostru
- b) Laptele tranzitor
- c) Laptele matern maturizat
- d) Laptele mamei care a născut copil la termenul de 30 săptămâni
- e) Laptele de vacă

9. Alegeți afirmația corectă ce definesc alimentația naturală exclusivă :

- a) Nu se dă copilului nici un alt aliment în afară de lapte matern
- b) Nu sunt oferite biberoane
- c) Se hrănește de 8-12 ori pe zi
- d) Se hrănește de 5-6 ori pe zi
- e) Se hrănește nu mai des de 6-8 ori pe zi

10. Afirmati contraindicația alimentației naturale:

- a) BHNN
- b) Forma activă a tuberculozei
- c) Mastita
- d) Dehiscenta palatului dur și buzei
- e) Întrebuințarea antibioticelor de către mamă

11. Marcați care poate fi pierderea maximală în greutate în primele zile de viață la nou-născut?

- a) 15% din greutate
- b) 200 grame
- c) 400 grame
- d) 6% din greutate
- e) 10%

12. Indicați ce trebuie să includă rația copilului la vârsta de 3 luni aflat la alimentația naturală?

- a) Lapte + suc de fructe
- b) Lapte + gălbenuș de ou
- c) Lapte + fiertură de legume
- d) Lapte + pireu de legume
- e) Numai lapte matern

13. Selectați care este raportul proteine : lipide : glucide în laptele matern?

- a) 1:2:1
- b) 2:3:6
- c) 1:3:6
- d) 2:2:3
- e) 1:1:6

14. Enumerați ABC-ul corect al reanimării neonatale:

- a) I. - A - inițierea respirației; B - permeabilizarea căilor respiratorii; C - menținerea circulației
- b) II. - A - permeabilizarea căilor respiratorii; B - prevenirea pierderilor de căldură; C - inițierea respirației
- c) III. - A - permeabilizarea căilor respiratorii; B - inițierea respirației; C - menținerea circulației
- d) IV. - A - prevenirea pierderilor de căldură; B - inițierea respirației; C - administrarea medicamentelor

e) V. – B-Tratament medicamentos

15. Selectați afirmația adevărată pentru un nou-născut care este ventilat eficient?

- a) Expansie toracică bună, nou-născutul pare că respiră adânc
- b) Manometrul înregistrează o presiune de ventilație adecvată pentru un anumit copil, chiar dacă nu observați prezența unor mișcări de ridicare și coborâre a toracelui
- c) Observați mișcări toracice, nou-născutul respiră ușor
- d) Observați mișcări abdominale
- e) Frecvența respiratorie mai mult de 40/min

16. Marcați cât durează etapa inițială a reanimării neonatale:

- a) 10-15 sec
- b) 15 - 30 sec
- c) 30-60 sec
- d) 1 minut
- e) Mai mult de 1 minut

17. Selectați afirmația adevărată referitor la scorul Apgar:

- a) Scorul Apgar, fiind apreciat la 1 min. după naștere, nu este util pentru decizia de inițiere a reanimării
- b) Scorul Apgar nu este necesar la nou-născutul care necesită reanimare
- c) Pipele utilizate la nou-născuți sunt toate de aceeași mărime, atât pentru prematuri cât și pentru cei născuți la termen
- d) Scorul Apgar nu este necesar pentru nou-născut prematur
- e) Nu este obligator de apreciat Scorul Apgar la 5 min.

18. Selectați care nu este calea de transmitere a agentului patogen de la mamă la făt:

- a) Hematogen
- b) Prin apele fetale infectate
- c) Limfogen
- d) Ascendente
- e) Descendent

19. Selectați la ce vârstă eliminările din ochi pot fi socotite ca manifestare a infecției bacteriene:

- a) 24-48 ore
- b) 2-5 zile
- c) 10-12 ore
- d) 48 ore
- e) 172 ore

20. Selectați simptomul cel mai precoce al enterocolitei ulcero-necrotice (70%) la prematuri:

- a) Balonarea abdomenului
- b) Instabilitatea temperaturii
- c) Apnee
- d) Bradicardie
- e) Tahicardie

21. Marcați care din candida cel mai frecvent provoacă candidoza la nou-născuți?

- a) Candida tropicalis
- b) Candida parapsilosis

- c) Candida albicans
- d) Candida krusei
- e) Candida glabrata

22. Indicați semnul care **nu** este caracteristic pentru septicemia neonatală:

- a) Anemie normo - hipocromă
- b) Leucocitoză
- c) Deviere spre stânga formula leucocitară
- d) Proteina reactivă pozitivă
- e) Eozinofilie

23. Indicați poziția în incubator în caz de detresă respiratorie neonatală, hipovolemie fără edem cerebral:

- a) Poziția Tredelenburg
- b) Orizontală
- c) Cu capul ridicat
- d) Poziția Anti- Tredelenburg
- e) Cu capul hiperflexat

24. Restabilirea volumului de sânge în caz de detresă respiratorie severă neonatală se efectuează cu:

- a) Hemotransfuzie cu sânge de donor
- b) Masă eritrocitară
- c) Glucoză 10%
- d) Plasma
- e) Factori de coagulare

25. Selectați afirmația adevărată pentru hiperbilirubinemia "fiziologică" neonatală:

- a) Apariția icterului la a III zi de viață
- b) Nivelul bilirubinei în cordonul ombilical este egal cu 40 mcmmol/l
- c) Predomină bilirubina directă
- d) Creșterea bilirubinei pe oră - 5-6 mcmmol/l
- e) Anemie în sângele periferic

26. Selectați ce **nu** se referă la Indicațiile exsanguinotransfuziei în boala hemolitică neonatală:

- a) Culoarea icterică a tegumentelor în primele ore de viață
- b) Reticulocitoza
- c) Creșterea pe oră a bilirubinei mai mult de 6 mcmmol/l/oră
- d) Bilirubina ombilicală mai mare de 60 mcmmol/l
- e) Bilirubina ombilicală mai mare de 20 mcmmol /l

27. Indicați afirmația corectă referitor la icterul din prima zi după naștere:

- a) Defectele enzimatice ale eritrocitelor
- b) Alimentație la sân
- c) Incompatibilitatea după Rh factor
- d) Hipertireoidism
- e) Hipotiroidism

28. Selectați factorul care **nu** provoacă apariția icterului "fiziologic"?

- a) Imaturitatea ficatului la nou-născuți
- b) Intestinul steril la nou-născuți
- c) Transfuzie placentă-fetală
- d) Activitate înaltă a β -glucuronidazei în peretele intestinal la nou-născuți

e) Copil născut la termen

29. Alegeți în ce cazuri apare icterul la nou-născuți în prima zi de viață?

- a) Boala Mincovschii-Șofar
- b) Galactozemia
- c) Atrezia coledocului
- d) Incompatibilitatea după sistemul ABO
- e) Hipotiroidism

30. Selectați ce este corect pentru icterul cauzat de laptele matern?

- a) Apare în primele 24 ore de viață
- b) Se caracterizează printr-un nivel mărit al bilirubinei conjugate
- c) Este legat de cantitatea mărită în lapte a colinesterazei
- d) Dispare la administrarea dozelor mărite de phenobarbital
- e) Este legat de nivelul mărit a pregnandiului în lapte

31. Selectați în ce caz boala hemolitică a nou-născuților nu apare :

- a) Incompatibilitate ABO
- b) Incompatibilitate Rh factor
- c) Antigen Rh rar întâlnite
- d) Antigene sistem Liuteran
- e) Rezus factor pozitiv

32. Selectați prin ce se caracterizează varianta displastică a reținerii de dezvoltare intrauterină a fătului?

- a) Retenția în masă
- b) Retenția în lungime a copilului
- c) Retenția proporțională în masă și în lungime
- d) Se asociază cu diferite anomalii congenitale
- e) Se mai numește variantă simetrică

33. Alegeți care tip al retardului dezvoltării fizice intrauterine a fătului se numește displastic?

- a) Masa corporală mică
- b) Masa și lungimea mică
- c) Masa și lungimea mare + anomalie congenitală
- d) Masa mare + anomalie congenitală
- e) Lungimea mică + anomalie congenitală

34. Marcați până la cât timp se menține hipertonusul fiziologic la prematuri:

- a) 2-3 săptămâni
- b) 3-4 săptămâni
- c) 1-2 luni
- d) 3 luni
- e) 4 luni

35. Selectați ce este caracteristic pentru scaunul prematurului ce se află la alimentația naturală:

- a) Culoarea galben - aurie
- b) Culoarea cafeniu - deschisă
- c) Scaun incolor
- d) Culoarea cu adaus verzui
- e) Culoarea albuie

36. Precizați temperatura optimă în incubator pentru îngrijirea prematurilor cu greutatea de 1,5 kg în a II săptămână de viață:

- a) 30 °C
- b) 28 °C
- c) 37 °C
- d) 32-33 °C
- e) 34-35 °C

37. Selectați care din stările enumerate mai jos **nu** este caracteristic pentru prematuri:

- a) Simptomul Finkelstein
- b) Lanugo
- c) Sclerema
- d) Hipotonie musculară
- e) Hipertonie musculară

38. Marcați până la ce vârstă menținerea icterului se socotește fiziologică la copiii prematuri:

- a) 5-6 zile
- b) 8-10 zile
- c) 10-15 zile
- d) 1 lună
- e) 2 luni

39. Selectați termenul de apariție a reflexului de supt și deglutiție la prematuri :

- a) 32-33 săptămâni de gestație
- b) 34 săptămâni de gestație
- c) 29 săptămâni de gestație
- d) 30 săptămâni de gestație
- e) 23 săptămâni

40. Indicați necesarul în calorii la vârsta de 1 lună la prematuri:

- a) 100 kcal/kg
- b) 110 kcal/kg
- c) 120 kcal/kg
- d) 135 - 140 kcal/kg
- e) 80 kcal/kg

41. Indicați vârsta copilului la care dispare reflexul Babchin:

- a) 0 lună
- b) 3 luni
- c) 4 luni
- d) 6 luni
- e) 1 an

42. Indicați dimensiunea corectă a sondei endotraheale corespunzătoare greutății la naștere de 1000 - 2000 g:

- a) 1,0
- b) 1,5
- c) 2,0
- d) 2,5

e) 3,0

43. Selectați care din următoarele este recomandat pentru aspirația meconiului din trahee la nou născut?

- a) Sonda endotraheală
- b) Sonda de aspirație 6 sau 8 Fr
- c) Sonda de aspirație introdusă prin sonda endotraheală
- d) Sonda nasogastrică
- e) Sonda gastrică

44. Indicați când se manifestă conjunctivita cu chlamidia:

- a) Imediat după naștere
- b) La 3-5 zi de viață
- c) După I săptămână de viață
- d) În săptămâna III de viață
- e) Până la o săptămână de viață

45. Indicați ce este caracteristic pentru conjunctivita condiționată de *Neisseria gonorrhoeae* la nou născuți:

- a) Afectarea unui ochi
- b) Conjunctivita bilaterală
- c) Afectarea ambilor ochi, apoi concentrarea infecției doar la unul singur
- d) Conjunctivita seroasă
- e) Midriaza

46. Indicați când apar semnele clinice ale enterocolitei ulcero-necrotice la prematuri:

- a) 1 zi
- b) 3-10 zi
- c) 14 zi
- d) 16 zi
- e) 21 zi

Complement multiplu

1. Indicați complicațiile hipotermiei la nou-născuți:

- a) Hipoglicemia
- b) Șocul
- c) Apnea
- d) Hemoragia intraventriculară
- e) Acidoza metabolică

2. Marcați metodele necesare pentru menținerea temperaturii corpului copilului în timpul transportării:

- a) Contactul "piele la piele"
- b) Incubatoarele de transport
- c) Saltele umplute cu apă
- d) Copilul învelit în plapumă
- e) Copilul înfășat foarte strâns

3. Marcați mecanismele transmiterii de căldură la nou-născuți:

- a) Radiația
- b) Iradierea
- c) Conducția
- d) Convenția
- e) Evaporarea

4. Selectați termenul și temperatură la care poate fi păstrat laptele matern:

- a) 6 luni la $t -20^{\circ}\text{C}$
- b) O săptămână la $t +4^{\circ}\text{C}$
- c) 24 ore la $t +10^{\circ}\text{C}$
- d) 3 zile la $t +15^{\circ}\text{C}$
- e) 24 ore la $t +4^{\circ}\text{C}$

5. Indicați beneficiile laptelui matern:

- a) Protecția împotriva infecției
- b) Protecția față de alergii
- c) O incidență mai scăzută a sindromului morții subite la copii
- d) O mai bună dezvoltare psihomotorie
- e) Risc pentru diabet infantil

6. Indicați ce este caracteristic pentru suptul corect al copilului la sân:

- a) Copilul trebuie să cuprindă o porțiune cât mai mare a sânului în gură
- b) Copilul sugă într-un ciclu supt-înghițit-respirat
- c) Mamelonul, areola au formă de "tetină" în gura copilului
- d) Limba copilului cuprinde ca o cupă mamelonul și o undă de compresie se deplasează de-a lungul limbii către partea din spate a gurii
- e) Mandibula se ridică apăsând laptele

7. Indicați semne ale unei poziționări corecte la sân a sugarului:

- a) Gura copilului e larg deschisă
- b) Bărbia copilului atinge sânul
- c) Mamelonul arată aplatizat
- d) Buza inferioară a copilului este curbată către exterior
- e) Laptele va fi găsit insuficient în sân

8. Indicați care sunt gesturile de reanimare neonatală pentru componentul B al ABC-ului reanimării:

- a) Folosirea balonului și a măștii
- b) Medicația
- c) Introducerea sondei endotraheale
- d) Ventilarea cu presiune pozitivă
- e) Stimularea tactilă

9. Marcați modificările provocate de aspirația de meconiu la născut:

- a) Obstrucția căilor respiratorii
- b) Dereglarea schimbului de gaze
- c) Creșterea rezistenței în vasele pulmonare
- d) Boala membranelor hialine

e) Micșorarea rezistenței în vasele pulmonare

10. Indicați care dintre următoarele sunt considerate complicații ale masajului cardiac extern?

- a) Fracturi costale
- b) Stop cardiac
- c) Ruptura hepatică
- d) Pneumotorax
- e) Ruptură de claviculă

11. Selectați cele mai frecvente cauze ale cianozei nou-născutului în sala de naștere:

- a) Eritrocitoza
- b) Hipotermia
- c) Apnea
- d) Malformații cardiace congenitale
- e) Pneumotoraxul

12. Indicați căile de administrare a adrenalinei la noul-născuț:

- a) Intravenos
- b) Intramuscular
- c) Endotraheal
- d) Intrarectal
- e) Intracutanat

13. Selectați corect primele 3 etape ale introducerii laringoscopului și a sondei endotraheale în timpul intubației neonatale:

- a) Introducerea sondei endotraheale în glotă
- b) Fixarea capului nou-născutului
- c) Introducerea lamei între limbă și palat până la baza limbii
- d) Scoaterea laringoscopului și stingerea becului
- e) Ridicarea lamei și vizualizarea epiglotei și a glotei

14. Selectați care dintre următoarele sunt semnele de hipovolemie:

- a) Paloarea persistentă după oxigenare
- b) Puls slab asociat cu frecvența cardiacă bună
- c) Hipertensiune arterială
- d) Răspuns nesatisfăcător la manevrele de reanimare
- e) Puls amplu cu frecvență cardiacă normală

15. Marcați primele patru măsuri necesare de efectuat în cazul excursiei neadecvate a cutiei toracice în timpul ventilării pulmonare artificiale (VAP) la nou-născuț:

- a) Mărim presiunea la inspirație până la 20-40 mm col H₂O
- b) Confirmăm că gura copilului e întredeschisă
- c) Aspirăm conținutul căilor respiratorii
- d) Controlăm ermeticitatea etanșezării măștii pe față
- e) Schimbăm poziția copilului ca să restabilim permeabilitatea căilor respiratorii

16. Selectați din următoarele patologii infecțioase ale bontului ombilical la noul-născuț:

- a) Omfalita catarală
- b) Gangrena bontului ombilical
- c) Sindrom Bekwit

- d) Ombilic amniotic
- e) Ulcer ombilical

17. Selectați agenții patogeni frecvenți ai conjunctivitei la nou-născuți :

- a) Escherichia coli
- b) Neisseria gonorrhoeae
- c) Staphylococcus aureus
- d) Staphylococcus epidermalis
- e) Streptococcus

18. Selectați semnele caracteristice pentru conjunctivita bacteriană la nou-născuți:

- a) Eliminări purulente
- b) Edemul și hiperemia pleoapelor
- c) Injectarea vaselor conjunctivei
- d) Eliminări sanguinolente
- e) Eliminări seroase

19. Indicați metodele de tratament în Candidoza la nou-născuți:

- a) Alimentația la sân (dacă nu este afectat mamelonul)
- b) Terapia locală
- c) Antibioticoterapia
- d) Preparate antifungice
- e) Preparate imunomodulatoare

20. Selectați afirmațiile corecte referitor la Septicemia neonatală precoce:

- a) Debut la 1 - 4 zi
- b) Evoluție "fulger"
- c) Detresă respiratorie
- d) Meningită
- e) Evoluție lentă

21. Selectați afirmațiile corecte referitor la Septicemia neonatală tardivă :

- a) Debut la 1 - 4 zi
- b) Evoluție "fulger"
- c) Detresă respiratorie
- d) Meningită
- e) Evoluție lentă

22. Marcați semnele de manifestă Meningita stafilococică neonatală:

- a) Febră
- b) Inhibare
- c) Hiperexcitabilitate
- d) Bombarea fontanelei
- e) Convulsii

23. Selectați prin ce se manifestă Septicemia cu escherichia coli la nou născuți:

- a) Evoluție lentă
- b) Febră
- c) Hipotermie
- d) Icter

e) Hepatomegalie

24. Selectați semnele caracteristice pentru depresia cardiorespiratorie la nou-născuți:

- a) Bradicardie
- b) Tahicardie
- c) Tonus muscular diminuat
- d) Tonus muscular mărit
- e) Hipotensiune arterială

25. Indicați primele 3 măsuri necesare de efectuat pentru a lichida șocul hipovolemic neonatal:

- a) Hemotransfuzie
- b) Introducerea plasmei, albuminei
- c) Soluții cristaloides
- d) Sânge placentar
- e) Dopamină

26. Indicați funcțiile Surfactantului:

- a) Prevenirea colabării alveolelor
- b) Acțiune bactericidă contra florei anaerobe
- c) Reglează microcirculația în plămâni
- d) Condiționează clearance-ul mucociliar
- e) Acțiunea bactericidă contra florei aerobe

27. Selectați principiile de bază ale terapiei respiratorii în caz de detresă respiratorie:

- a) Restabilirea permeabilității căilor respiratorii
- b) Oxigenarea adecvată
- c) Înlăturarea cauzelor detresei respiratorii
- d) Administrarea bicarbonatului de natriu
- e) Laringoscopia

28. Indicați semnele caracteristice pentru icterul fiziologic neonatal:

- a) Apariția lui după 24 ore de viață
- b) Viteza creșterii a bilirubinei pe oră - 6 mcmmol/l
- c) Evoluție ondulatorie
- d) Durata icterului mai mult de 28 zile
- e) Nivelul bilirubinei la sfârșitul I zile de viață mai puțin de 80 mcmmol/l

29. Selectați care din indicii enumerați mai jos confirmă prezența bolii hemolitice a nou-născutului?

- a) Anemie cu reticulocitoză
- b) Acidoza metabolică
- c) Hipoglicemia
- d) Icter din primele ore de viață
- e) Hepatosplenomegalia

30. Marcați ce este caracteristic pentru forma edematoasă a bolii hemolitice a nou-născutului?

- a) Hepatosplenomegalia
- b) Icter din prima oră de viață
- c) De obicei se dezvoltă după sistemul ABO
- d) Anemie pronunțată
- e) Dereglări pronunțate ale sistemului cardio-vascular

31. Indicați complicațiile exsanguinotransfuziei în boala hemolitică a nou-născutului:

- a) Enterocolita ulcero-necrotică
- b) Embolia
- c) Dereglări de electroliți
- d) Policitemia
- e) Stop cardiac cu edem pulmonar

32. Marcați cu ce se asociază Icterul în prima zi de viață:

- a) Enzimodeficit eritrocitar
- b) Alimentația naturală
- c) Incompatibilitatea în sistemul ABO
- d) Hipotiroidism
- e) Incompatibilitatea Rh factor

33. Indicați care din următoarele elemente corelează cu vârsta gestațională?

- a) α -fetoproteina
- b) Lungimea femurului fătului stabilit ecografic
- c) Testul cu oxitocină
- d) Estriolul în urină la mamă
- e) Diametrul biparietal al capului la făt

34. Selectați care din grupele enumerate ne indică prezența retardului în dezvoltarea fizică intrauterină a fătului:

- a) Prematurii cu masa corespunzătoare termenului de gestație
- b) Prematurii cu masa mai mică ca termenul de gestație
- c) Copii născuți la termen sau prematurii la care masa corporală e mai mică decât 10 centile
- d) Greutatea la naștere mai mult de 3000 gr.
- e) Talia la naștere 52 cm

35. Indicați criteriile de determinare a retardului dezvoltării fizice intrauterine a fătului:

- a) Morfologic
- b) Neuromuscular
- c) Indicele ponderal
- d) Concomitent morfologic și neuromuscular
- e) Tabelele centile

36. Selectați metodele de diagnostic antenatal al malformațiilor congenitale:

- a) Cercetarea ultrasonografică
- b) Determinarea α -fetoproteinei în sângele mamei
- c) Radiografia
- d) Datele examenului genetic
- e) Radioscopia

37. Selectați cauzele ce poate determina scăderea turgorului țesuturilor la nou-născut:

- a) Deshidratare
- b) Infecția intrauterină
- c) Hemoragia subarahnoidiană
- d) Hipotrofia congenitală

e) Hipotirioza congenitală depistată tardiv

38.Indicați cauzele tahicardiei la nou-născut :

- a) Hipotermie
- b) Hipertermie
- c) Persistența canalului arterial
- d) Fosa ovală deschisă
- e) asfixia moderată

39.Indicați care din reflexele fiziologice (arhaice) prezente la nou-născuți se determină la vârsta de un an?

- a) Reflexul de căutare
- b) Reflexul Robinson
- c) Reflexul Babinschii
- d) Reflexul Moro
- e) Reflexul de supt

40.Indicați cauzele palorii tegumentelor la nou-născuți:

- a) Anemie
- b) Șoc
- c) Ductus arteriosus persistent
- d) Policitemie
- e) Septicemie

41.Selectați cauzele acrocianozei la nou-născuți:

- a) Hipotermie
- b) Hipovolemie
- c) Sindromul copilului abia născut
- d) Ventilație neadecvată
- e) Policitemie

42.Marcați stările ce caracterizează simptomul "petei albe":

- a) Hipovolemie pronunțată
- b) Prezența dereglărilor vegetative în urma traumatizării sistemului nervos central
- c) Prezența anemiei pronunțate
- d) Nici una din cele enumerate mai sus
- e) Hipervolemia

43.Indicați modificările pielii considerate fiziologice pentru un nou-născut ?

- a) Paloare pronunțată
- b) Icterul tegumentelor în I zi de viață
- c) Milia
- d) Miliaria cristalină
- e) Nevus

44.Indicați beneficiile laptelui matern:

- a) Protecția împotriva infecției
- b) Protecția față de alergie
- c) O incidență mai scăzută a sindromului morții subite la copii
- d) O mai bună dezvoltare psihomotorie
- e) Risc pentru diabet infantil

45. Indicați simptomele hemoragiei acute neonatale:

- a) Se menține paliditatea, deși se continuă oxigenarea
- b) Tahicardie
- c) Pulsul în normă
- d) Puls slab, filiform
- e) Timpul de recolorare capilară prelungit

TESTELE ROMÂNĂ, LA NEONATOLOGIE.

Complementul simplu

1. E
2. C
3. C
4. B
5. D
6. D
7. D
8. B
9. A
10. B
11. D
12. E
13. C
14. C
15. C
16. B
17. A
18. E
19. B
20. A
21. C
22. E
23. C
24. B
25. A
26. E
27. C
28. E
29. D
30. E
31. E
32. D
33. E
34. C

Complementul multiplu

1. A,B,C,E
2. A,B,C,D
3. A,C,D,E
4. A,E
5. A,B,C,D
6. A,B,C,D
7. A,B,D
8. A,D,E
9. A,B,C,D
10. A,C,D
11. A,B,C,D
12. A, C
13. B,C,E
14. A,B,D
15. B,C,D,E
16. A,B,E
17. B,C
18. A,B,C
19. A,B,D
20. A,B,C
21. D,E
22. A,C,D,E
23. A,B,D,E
24. A,C,E
25. A,B,D
26. A,C,D
27. A,B,C
28. A,E
29. A,D,E
30. A,B,D,E
31. A,B,C,E
32. C,E
33. A,E
34. B,C

- | | |
|-------|-------------|
| 35. A | 35. A,E |
| 36. D | 36. A,B |
| 37. E | 37. A,B,D |
| 38. D | 38. B,E |
| 39. A | 39. C,E |
| 40. D | 40. A,B,E |
| 41. C | 41. A,C,E |
| 42. E | 42. A,C |
| 43. A | 43. C,D,E |
| 44. C | 44. A,B,C,D |
| 45. B | 45. A,D,E. |
| 46. B | |